

Foglio informativo della Conferenza degli uffici delle scuole pubbliche della Svizzera tedesca (DVK)


## Procedura in caso di sintomi di malattia e di raffreddore per i bambini della scuola dell'infanzia (1<sup>H</sup> e 2<sup>H</sup>)\*

Indicazioni e raccomandazioni per i genitori

Valido fino a marzo 2022

### Deve essere effettuato un test se:

- è avvenuto un contatto stretto (contatto a rischio) con una persona sintomatica sopra i 6 anni
- è avvenuto un contatto stretto (contatto a rischio) con una persona risultata positiva al test - indipendentemente dall'età
- anche senza un contatto a rischio, è presente almeno uno dei sintomi contrassegnati in rosso; i sintomi di una malattia cronica nota non sono rilevanti per la valutazione



Foglio informativo della Conferenza degli uffici delle scuole pubbliche della Svizzera tedesca (DVK)

## Procedura in caso di sintomi di malattia e di raffreddore per i bambini e i giovani della scuola primaria e secondaria (3<sup>H</sup> e 11<sup>H</sup>)\*

### Indicazioni e raccomandazioni per i genitori

#### Quando deve restare a casa vostro figlio?

Per i bambini e i giovani della scuola primaria e secondaria (3<sup>H</sup> – 11<sup>H</sup>)\* d'ora in poi valgono gli stessi criteri clinici come per gli adulti.

Se compaiono sintomi di malattia e di raffreddore compatibili con la COVID-19, il bambino o il giovane resta a casa e fa il test dal medico.

- Se il test risulta positivo, è indicato un isolamento.
- Se il test risulta negativo, il bambino o il giovane sta a casa per 24 ore dopo la scomparsa della febbre. Se poi si sente nuovamente bene e se il suo stato di salute generale è buono, può tornare a scuola.

Grazie a questa procedura semplice non è necessario prevedere schemi procedurali separati per la scuola primaria e secondaria.

\*secondo la grafia HarmoS